

MICOCIDE®

Econazol

Crema - Loción - Polvo

Uso externo

Industria Argentina
Venta bajo receta

Composición

Crema: cada 100 g de crema contiene:

Nitrato de econazol 1g; Alcohol cetílico 5 g; Alcoholes grasos autoemulsionables 8 g; Cera blanca 1 g; Propilenglicol 10 g; Laurilsulfato de sodio 2 g; Ácido benzoico 0,2 g; Butilhidroxianisol 0,005 g; Perfume lavanda 0,1 ml; Agua desionizada c.s.

Loción: cada 100 ml de loción contiene:

Nitrato de econazol 1 g; Alcohol 60 ml; Perfume lavanda 0,1 ml; Propilenglicol c.s.

Polvo: cada 100 g de polvo contiene:

Nitrato de econazol 1 g; Metilparabeno 0,02 g; Óxido de cinc 3 g; Anhídrido silícico coloidal 1 g; Perfume lavanda 0,1 ml; Talco c.s.

Presentación

MICOCIDE® se presenta en envases conteniendo 30 g de crema, 30 ml de loción y 30 g de polvo de uso externo.

Acción Terapéutica

Código ATC: D01AC

Antimicótico de amplio espectro.

Indicaciones

MICOCIDE® está indicado en el tratamiento de:

Pie de atleta (Tinea pedis): suele afectar las comisuras de los dedos de los pies y provocar mal olor, aspecto blanquecino y fisuras dolorosas, que si no son tratadas dan lugar a placas, extendiéndose a los dedos, planta y dorso del pie (forma intertriginosa) o bien comenzar en la planta del pie y pulpejos de los dedos provocando callosidades y fisuras muy dolorosas (forma hiperqueratósica) o lesiones inflamatorias en la placa, con vesículas o ampollas (forma deshidrótica).

Tiña crural: (Tinea cruris) por lo general comienza en la parte interna del muslo, como pequeñas manchas rojas, a veces con descamación fina, que se van uniendo a medida que crecen y se diseminan debido al rascado, pudiendo extenderse de no ser tratadas y surgiendo nuevas lesiones en la proximidad (en forma característica hacia genitales y entre glúteos) o a distancia (por ej.: debajo de mamas).

Tiña corporal: (Tinea corporis): afecta la piel "lampiña" de la cara, el tronco o las extremidades y comienza como una mancha rosada con descamación y picazón, aumentando de tamaño por los bordes, "en mancha de aceite" hasta

formar placas redondas u ovaladas por la aparición de vesículas (aspecto de anillo).

MICOCIDE® alivia la picazón, ardor, escamación y malestar que acompañan a los cuadros antes mencionados.

Posología y Forma de Administración

La dosis, así como la forma farmacéutica a utilizar y la duración del tratamiento, se establecerán individualmente para cada paciente, según criterio médico y cuadro clínico.

Como orientación se aconseja:

Micosis dérmicas: aplicar MICOCIDE® sobre la zona afectada, dos veces por día. Podrá emplearse la forma de crema, loción o polvo, según la afección a tratar y la localización.

Micosis ungueales: aplicar MICOCIDE® crema o loción, dos veces por día, de ser posible utilizando vendaje oclusivo.

Balanopostitis micóticas: aplicar MICOCIDE® crema en glande o prepucio, una vez por día, durante tres días.

Contraindicaciones

Antecedentes de alergia al Econazol o alguno de los componentes del producto.

Precauciones y Advertencias

Si se presenta enrojecimiento y/o prurito luego de cada aplicación, interrumpir el tratamiento y consultar al médico. No aplicar sobre los ojos o piel con heridas.

Producto de uso externo, no ingerir ni inhalar.

Embarazo y lactancia: Consulte a su médico.

Uso pediátrico: No usar en niños menores de 2 años, excepto bajo supervisión médica.

Reacciones Adversas

A las dosis recomendadas, MICOCIDE® es generalmente bien tolerado y no provoca efectos colaterales ni secundarios.

En personas hipersusceptibles, pueden llegar a presentarse trastornos locales leves (eritema, prurito, irritación, sensación de quemadura) que desaparecen espontáneamente o al suprimir el tratamiento.

Antagonismos y Anditotismos

A las dosis terapéuticas no presenta.

Sobredosificación

Aún no se han informado casos en que haya habido sobredosis no tratada. En caso de sobredosificación por ingestión accidental, concurrir al hospital más cercano o a los siguientes Centros de Intoxicaciones:

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA NIÑOS

-Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247 ó (011) 4962-6666
Sánchez de Bustamante 1399, C.A.B.A.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ADULTOS

·Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Av. Presidente Illía y Marconi (Haedo - Provincia de Buenos Aires).

·Hospital Fernández: (011) 4801-5555

Cerviño 3356, C.A.B.A.

Conservar al abrigo del calor excesivo (temperatura no mayor de 30° C)

Mantener bien tapado.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 39.237

Directora Técnica

Cecilia E. González, Farmacéutica.

Atlas Farmacéutica S.A.

J. V. González 2569

(C1417AQI) C.A.B.A.

Tel: (011) 4566-8188

CREMA

Elaborada en:

Coronel Méndez 440 (B1875DQJ)

Wilde, Pcia. de Buenos Aires.

LOCIÓN

Elaborada en:

J. V. González 2569

(C1417AQI) C.A.B.A.

POLVO

Elaborado en:

Brasil 3131

(C1260AB) C.A.B.A.

Fecha de última revisión: Noviembre 2008.

