

TOTALATLAS FORTE®

Cloruro de Sodio 3%

Spray nasal

Solución hipertónica

Industria Argentina
Venta bajo receta

Composición

Cada 100 ml contiene: Cloruro de Sodio 3 g; Excipientes: Fosfato Monosódico Anhidro 0,046 g; Fosfato Disódico Anhidro 0,900 g; Cloruro de Benzalconio 0,020 g; Ácido Clorhídrico y/o Hidróxido de Sodio c.s.p. pH; Agua Purificada c.s.p. 100 ml.

Presentación

Frascos por 25 ml, con válvula dosificadora.

Acción Terapéutica

Código ATC: R01AX10

Aumenta el clearance mucociliar. Fluidifica el mucus de las fosas nasales. Uso tópico.

Indicaciones

Ayuda a aliviar los síntomas de: sinusitis, rinitis de cualquier etiología, congestión y goteo nasal. Indicado toda vez que se requiera higienización de las fosas nasales por remoción y fluidificación del mucus. También como tratamiento previo al uso de esteroides por vía nasal. En lactantes: coriza (resfrío común), obstrucción por secreciones de cualquier etiología.

Acción Farmacológica

Actúa por acción tópica, favoreciendo la eliminación del mucus, del polvo, alérgenos y otras partículas de las fosas nasales, aumentando el movimiento ciliar.

Posología / Dosificación



Spray Nasal: adultos, niños e infantes, se recomienda 1 ó 2 pulsaciones en cada fosa nasal, 3 ó más veces por día, según criterio médico.

Modo de Administración

TOTALATLAS FORTE® Spray nasal lleva adherido herméticamente al frasco un aplicador nasal que facilita su uso, produciendo un spray que llega efectivamente a la profundidad de las fosas nasales.

1 – Quitar la tapa exterior

2 – Introducir el extremo del pulsador en el orificio nasal, manteniendo la cabeza y el frasco en posición vertical.



3 – Presionar el pulsador hacia abajo, inspirando el spray emitido por el pulsador.

4– Lavar el pico del pulsador y colocar la tapa protectora.

Contraindicaciones

No se han descrito hasta el momento.

Advertencias y Precauciones

Usar a temperatura ambiente.

Embarazo y Lactancia: puede utilizarse sin restricciones.

Pediatría: ver lo indicado en “Posología”.

Geriatría: no se conocen restricciones en este grupo etario.

Interacciones

No se han descrito, hasta el momento, interacciones con otros medicamentos.

Reacciones Adversas

No se han registrado hasta el momento.

Sobredosificación

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología:

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA NIÑOS:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247/6666

Sánchez de Bustamante 1399 (C.A.B.A.)

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ADULTOS:

Hospital Fernández (Unidad Toxicológica): (011) 4808-2655

Cerviño 3356 (C.A.B.A.)

Conservación

Conservar a temperatura ambiente, preferentemente a menos de 30°C.

No congelar.

Mantener alejado del alcance de los niños.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°: 56.273

Directora Técnica:

Cecilia E. González, Farmacéutica

Elaborado por:

ATLAS FARMACEUTICA S.A.

Joaquín V. González 2456/2569/71

(C1417AQL) C.A.B.A.

Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: (011) 4566-8188

Domicilio Legal:

Calle 56, N° 720, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Fecha de última revisión: Mayo de 2011

